

## 令和3年度 降下ばいじん測定結果

地点名	単位 [t/km <sup>2</sup> ・月]													年平均値の目標値
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	
松原	2.7	3.0	3.1	2.0	[2.1]	2.6	[1.7]	1.4	2.2	1.5	1.1	2.5	2.2	8.0以下
神田	2.8	3.4	3.1	2.5	[41.1]	2.8	[2.1]	1.7	2.0	1.7	1.4	2.3	2.3	8.0以下
港	4.6	4.6	4.1	3.2	[23.5]	4.9	[3.5]	3.9	3.3	3.4	3.1	4.8	4.0	8.0以下
富久	2.4	2.2	2.4	2.5	[34.3]	2.6	[1.3]	1.9	2.0	1.7	1.4	2.4	2.2	8.0以下
南原	2.0	4.0	1.8	[1.3]	[29.1]	3.0	1.6	2.2	2.3	2.0	0.9	2.8	2.3	8.0以下
城南	2.2	3.7	1.3	2.3	[3.1]	1.4	[1.4]	1.9	2.6	1.8	0.6	2.0	2.0	8.0以下
新津	2.2	3.3	1.0	1.6	[29.0]	1.2	[0.8]	1.3	1.9	2.1	1.0	2.6	1.8	8.0以下
白石	1.7	2.3	0.4	1.4	[35.2]	1.7	[0.8]	0.9	1.7	1.7	1.0	1.8	1.5	8.0以下
二崎	1.6	3.1	0.5	0.4	[2.0]	2.5	[1.2]	1.4	1.2	1.8	0.4	2.5	1.6	8.0以下
片島	1.3	2.5	0.2	1.4	[1.8]	0.7	[0.7]	1.3	1.4	2.3	1.2	1.9	1.4	8.0以下
鋤崎	2.3	3.9	1.1	2.0	[2.6]	1.3	[1.1]	1.2	2.3	2.4	1.2	1.9	2.0	8.0以下
幸町	4.8	5.4	2.6	2.6	[6.6]	3.7	[2.6]	2.5	3.0	2.3	2.7	3.5	3.3	8.0以下
平均	2.5	3.4	3.4	2.0	[17.5]	2.4	1.6	1.8	2.2	2.0	1.3	2.6	2.2	8.0以下